

## SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT ! 2015. május 7.

3./ Szőlő fenológiai állapota: 5-7 leveles állapot.

A térségben 2015.május 1 és május 7 közötti időszakban az átlagos léghő 15.60 C° volt. A hullott csapadék: 16.4 mm . Levélen a folyamatos cseppfolyós vízborítottság több napon keresztül ( május 5-t kivéve) meghaladta minimum a 8-8 órát, így a peronoszpóra fertőzés létrejöttének feltételei megvalósultak. Az átlagos relatív páratartalom 86 %- t elérte, mely a lisztharmat fejlődését segítette..

**A./** A térségben a **Peronoszpóra fertőzés** kialakulásának egyértelműen kedvezett az időjárás. Aki nem, vagy május 1-t megelőzően védekezett annak a peronoszpóra ellen be kell avatkozni!

**B./** **A Lisztharmat primér fertőzési tüneteinek napokon belüli megjelenésére számíthatunk, ezért minden ültetvény esetében indokolt a kórokozó elleni hatékony védelem.**

**C./** **A Szürkerothadás fertőzés** fellépésének a magas relatív páratartalom kedvező. Megelőző védelem a kevésbé széljárta területeken feltétlenül szükséges.

**D./ Szőlómoly lárva ellen még nem kell beavatkozni.**

**E./ Szőlő-levélatka ellen aki már védekezett, annak nem indokolt most beavatkozni.**

*Minden TERMELŐNEK javaslom az ültetvényeinek tüzetes, folyamatos átvizsgálását!!!*

Aki nem, vagy május 1-t megelőzően védekezett annak a feltétlenül javaslom a fentiek alapján a védekezést 4-5 napon belül elvégezni!

Választható készítmények:

Lisztharmat ellen-      Thiovit Jet                      50 g / 100 liter , vagy  
                                    Karathane Star              60 ml/ 100 liter.  
                                    (inkább a Karathane Star alkalmazását javaslom)

Peronoszpóra, szőlőorbánc ellen-  
                                    Antracol 70 WD      160 g/100 liter ( II. kategória) vagy  
                                    Dithane DG              200 g/100 liter( II./III. kategória vagy  
                                    Penncozeb DG        200 g/100 liter( II./III. kategória vagy  
                                    Vondozeb Plus        200 g/100 liter( II./III. kategória vagy.

Peronoszpóra, szürkerothadás ellen-  
                                    Folpan 80 WDG      100 g/100 liter (I. kategória) vagy,  
                                    Folpan 48 SC        200 g/100 liter (I. kategória).

Szürkerothadás ellen-  
                                    Topsin M70WDG      120 g/100 liter ( II. kategória) vagy,  
                                    Tiuram Granuflo      350 g/100 liter ( II. kategória).

**A megadott dózisok 1000 m<sup>2</sup>-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)**

A vaskeresztesi hegyen, a szőlő levelén található többnyire kerek, világossárga foltok valószínűleg a szántóföldről elsodródott gyomirtó szer károsításának hatása.

Vaskeresztes, 2015. május 7.

Hatos István