

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. május 15.

4./ Szőlő fenológiai állapota: fűrtmegnyulás kezdete..

A térségben 2015.május 8. és május 15. közötti időszakban az átlagos léghő 15.70 C° volt. A hullott csapadék: 29.2 mm . Levélen a folyamatos cseppfolyós vízborítottság több napon keresztül (május 9; 13-14; 15.) meghaladta minimum a 3-8 órát, így a peronoszpóra fertőzés létrejöttének feltétele a cseppfolyós víz jelenléte alapján megvalósult, azonban az alacsony, a 10 C° alatti hőmérsékleti viszonyok miatt az inkubációs idő május 14-től számítottan (max.) 10 nap. Az átlagos relatív páratartalom 75 %- t elérte, mely a lisztharmat fejlődését segítette.

A./ A térségben a **Peronoszpóra fertőzés** elleni védelem időpontjának meghatározásánál az inkubációs idő figyelembevételével történjen, ha jégkár nem érte az ültetvényt. Jégkár esetén a lehető leghamarabbi beavatkozást javaslok.

B./ A **Lisztharmat** primér fertőzési tüneteinek megjelenésére számíthatunk, ezért minden ültetvény esetében továbbra is indokolt a kórokozó elleni **hatékony megelőző védelem**.

C./ A **Szürkerothadás fertőzés** fellépését a sérült ültetvényekben a magas relatív páratartalom elősegíti. A jégkárt szenvedett ültetvényeknél a beavatkozás (lehetőleg minél hamarább) feltétlenül szükséges.

D./ Szőlómoly lárva ellen még nem kell beavatkozni.

E./ Szőlő-leválatka ellen aki már védekezett, annak nem indokolt most beavatkozni.

Minden TERMELŐNEK javaslom az ültetvényeinek tüzetes, folyamatos átvizsgálását!!!

Javasolt készítmények:

Lisztharmat ellen- Thiovit Jet 50 g / 100 liter , vagy
Karathane Star 60 ml/ 100 liter.
(inkább a Karathane Star alkalmazását javaslom)

Peronoszpóra, szőlőorbánc ellen-
Antracol 70 WD 160 g/100 liter (II. kategória) vagy
Dithane DG 200 g/100 liter(II./III. kategória vagy
Penncozeb DG 200 g/100 liter(II./III. kategória vagy
Vondozeb Plus 200 g/100 liter(II./III. kategória vagy.

Peronoszpóra, szürkerothadás ellen-
Folpan 80 WDG 100 g/100 liter (I. kategória) vagy,
Folpan 48 SC 200 g/100 liter (I. kategória).

Szürkerothadás ellen-
Topsin M70WDG 120 g/100 liter (II. kategória) vagy,
Tiuram Granuflo 350 g/100 liter (II. kategóri).

Javaslom az előzőek alapján összeállított technológia kiegészítését lisztharmat tünet megjelenése esetén, vagy jelentős jégkár esetén:

Pl. Folicur solo 40 ml/100 liter (II. kategória) vagy
Flint Max 20 g/100 liter (I. kategória) vagy
Falkon 460 EC 30 ml/100 liter (II. kategória) .

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)

Vaskeresztes, 2015. május 15.

Hatos István