

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. június 29.

8./ Szőlő fenológiai állapota : bogyó növekedés.

2015. június 18 és június 28. közötti időszakban az átlagos léghő 17 C° volt. A térségben a hullott csapadék: Kőszegen 26,4 mm, míg Vaskeresztesen június 30,8 mm eső hullott. Levélen cseppfolyós vízborítottság Kőszeg térségében június 23-24-én 24 óra , június 27-én 3 óra, június 28- án 4 óra hosszan alakult ki, Vaskeresztes térségében június 19-én meghaladta a 3 órát, június 20-án a 4 órát, június 22-én a 10 órát, június 23-24-én a 31 órát, június 28-án a 8 órát.

Az átlagos relatív páratartalom 70-80 % között ingadozott.

A./ Peronoszpóra fertőzés feltétele a vízborítottságoknak megfelelően kialakult(inkubációs idő: 7 nap).

B./ A Lisztharmat (másodlagos) fertőzés kialakulásának nagyon kedvező a 25 C° nappali felmelegedés melletti magas relatív páratartalom!!! ! Minden esetben indokolt a kórokozó elleni **hatékony védelem.**

Kontaktként bogyófertőzés esetén elsősorban a Karathane Star-t javaslom

C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye alacsony. Esetleges mechanikai sérülések esetén javaslom a megelőző védelmet.

D./ Az amerikai szőlőkabóca lárvafejlődése elindult, a térségben is számíthatunk a védekezés szükségességére!!!

E./ Tarka szőlómoly ellen nem indokolt a védekezés.

F./ Gubacsatka további felszaporodást nem tapasztaltam.

Minden termelőnek javaslom az ültetvényeinek tüzetes átvizsgálását. A jelen hőmérsékleti viszonyok között a javasolt permetezési forduló hossza lehetőleg 10-11 napon belüli legyen, ezt indokolja a jelentős lisztharmat fertőzésveszély és a folyamatosan kialakuló peronoszpóra fertőzést biztosító cseppfolyós vízborítottság.

Javasolt készítmények a védekezési technológia összeállításához:

A./Lisztharmat ellen-

Topas 100 EC	30 ml/100 liter, vagy
Falkon 460 EC	30 ml/100 liter, vagy
Sythane Duplo	13 ml/100 liter, vagy
Dynali	60 ml/100 liter, vagy
Raly Q SC	100 ml/100 liter, vagy
Talendo Extra	25 ml/100 liter,
Vivando	25 ml/100 liter
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

B./ Peronoszpóra ellen- hatásmód szerinti rotálás mellett-

I./ Javaslat Pergado Cu	400 g/100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
II./ Javaslat Curzate Super DF	200 g/ 100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
III./ Javaslat Tanos 50 DF	40 g/ 100 liter; (helyi felszívódó + kontakt), vagy
IV./ Javaslat Valbon	200 g/100 liter (helyi felszívódó).
Pergado Cu helyettesítő készítmény - Acrobat MZ ,	
Curzate R helyettesítő készítmény –Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben R, Curzate Super DF, Kupfer Fusilan WG.	
Tanos 50 DF helyettesítő készítmény – Mildicut, Enervin.	
Valbon helyettesítő készítmény - Melody Compact.	

C./ Szükepenész, lisztharmat ellen-

Folicur solo	40 ml/100 liter, vagy
Tebusha 25 EW	40 ml/100 liter, vagy
Flint Max	20 g/100 liter, vagy
Collis SC,	40 ml/100 liter, vagy
Cantus	50 g/100 liter.
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

D./ Szürkepenész ellen-

Pyrus 400 SC	250 ml/100 liter, vagy
Scala	170 ml/100 liter, vagy
Tiuram Granuflow	350 g/100 liter.

E./ Peronoszpóra – lisztharmat - szürkerothadás elleni kombinációk kialakításához:

Cabrio Top	200 g/100 liter, vagy
Shavit F	200 g/100 liter
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)