

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. július 5.

9./ Szőlő fenológiai állapota : bogyó növekedés.

2015. június 29 és július 5. közötti időszakban az átlagos léghő 22.3-23.5 C° volt. A térségben a jelölt időszakban nem hullott csapadék. A térségben a levélen a cseppfolyós vízborítottság utoljára június 28-án haladta meg a 4 órát. Az átlagos relatív páratartalom 62-75 % között ingadozott.

A./ Peronoszpóra fertőzés feltétele a vízborítottságnak megfelelően utoljára június 28-án, Vaskeresztesen július 6-án alakult ki.

B./ A Lisztharmat (másodlagos) fertőzés kialakulásának továbbra is nagyon kedvező a 25°-t meghaladó nappali felmelegedés, valamint a magas relatív páratartalom!!! Új bogyó fertőzéseket lehet találni! Minden esetben indokolt a kórokozó elleni hatékony védelem. Kontaktként bogyófertőzés esetén elsősorban a Karathane Star-t javaslom

C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye alacsony. Esetleges mechanikai sérülések esetén javaslom a megelőző védelmet.

D./ Az amerikai szőlőkabóca lárvafejlődése elindult, a térségben javaslom az első védekezés elvégzését!!!

E./ Tarka szőlómoly ellen nem indokolt a védekezés, a nyári nemzedék imágóinak rajzása (július 3.) kezdődik.

F./ Gubacsatka további felszaporodást nem tapasztaltam.

Minden termelőnek javaslom az ültetvényeinek tüzetes átvizsgálását. A jelen hőmérsékleti viszonyok között a javasolt permetezési forduló hossza lehetőleg 10-11 napon belüli legyen, ezt indokolja a jelentős lisztharmat fertőzésveszély.

készítmények a védekezési technológia összeállításához:

A./Lisztharmat ellen-

Falkon 460 EC	30 ml/100 liter, vagy
Vivando	25 ml/100 liter, vagy
Topas 100 EC	30 ml/100 liter, vagy
Sythane Duplo	13 ml/100 liter, vagy
Dynali	60 ml/100 liter, vagy
Raly Q SC	100 ml/100 liter, vagy
Talendo Extra	25 ml/100 liter.
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

Bogyófertőzésnél: Falkon 460 EC 30 ml/100 liter,
+ Karathane Star 60 ml/ 100 liter.

B./ Peronoszpóra ellen- hatásmód szerinti rotálás mellett-

I./ Javaslat Pergado Cu	400 g/100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
II./ Javaslat Curzate Super DF	200 g/ 100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
III./ Javaslat Tanos 50 DF	40 g/ 100 liter; (helyi felszívódó + kontakt), vagy
IV./ Javaslat Valbon	200 g/100 liter (helyi felszívódó).
Pergado Cu helyettesítő készítmény	- Acrobat MZ , Valis M.
Curzate R helyettesítő készítmény	-Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben R, Curzate Super DF, Kupfer Fusilan WG.
Tanos 50 DF helyettesítő készítmény	- Mildicut, Enervin.
Valbon helyettesítő készítmény	- Melody Compact.

C./ Szükepenész, lisztharmat ellen-

Folicur solo	40 ml/100 liter, vagy
Tebusha 25 EW	40 ml/100 liter, vagy
Flint Max	20 g/100 liter, vagy
Collis SC,	40 ml/100 liter, vagy
Cantus	50 g/100 liter.
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

D./ Peronoszpóra – lisztharmat - szürkerothadás elleni kombinációk kialakításához:

Cabrio Top	200 g/100 liter, vagy
Shavit F	200 g/100 liter
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

E./ Amerikai szőlőkabóca ellen-

Bulldock 25 EC	50 ml/100 liter, vagy
Fendona 10 EC	10 ml/100 liter, vagy
King 10 F	10 ml/100 liter, vagy
Laser	40 ml/100 liter, vagy
Actara SC	30 ml/100 liter.

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)

Vaskeresztes, 2015. július 5.

Hatos István