

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. július 16.

10./ Szőlő fenológiai állapota : bogyó növekedés.

2015. július 6 – július 15. közötti időszakban az átlagos léghő 21.8 (Kőszeg) -22.1 (Vaskeresztes) C° volt. A térségben a hullott csapadék: Kőszegen 56.4 mm, míg Vaskeresztesen 39.6 mm eső hullott. Levélen cseppfolyós vízborítottság Kőszeg térségében július 8-án 12 óra , július 13-án 10 óra, július 14-én 3 óra, július 16-án 11 óra hosszan; Vaskeresztes térségében július 6-án meghaladta a 4 órát, július 8-án a 3 órát, július 8 – 9-én 19 órát, július 12-én a 2 órát, július 13-án a 10 órát, július 14-én a 4 órát. Az átlagos relatív páratartalom 70 (Kőszeg) – 79 (Vaskeresztes) % között ingadozott.

A./ Peronoszpóra fertőzés feltétele a vízborítottságoknak megfelelően megvalósultak.. (inkubációs idő: 4 nap).

B./ A Lisztharmat (másodlagos) fertőzés kialakulásának továbbra is nagyon kedvező a 25°-t meghaladó nappali felmelegedés, valamint a magas relatív páratartalom!!! Folyamatosan található új fertőzés!!! Minden esetben indokolt a kórokozó elleni hatékony védelem. Kontaktként bogyófertőzés esetén elsősorban a Karathane Star-t javasolom.

C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye alacsony. Esetleges mechanikai sérülések esetén javasolom a megelőző védelmet.

D./ Tarka szőlómoly ellen nem indokolt a védekezés, a nyári nemzedék imágóinak rajzása július 3.-án kezdődött.

A jelen viszonyok között a javasolt permetezési forduló hossza lehetőleg 10 napon belüli legyen. Lisztharmat fertőzés esetén 6-8 napon belül indokolt. Készítmények a védekezési technológia összeállításához:

A./Lisztharmat ellen-

Falkon 460 EC	30 ml/100 liter, vagy
Vivando	25 ml/100 liter, vagy
Topas 100 EC	30 ml/100 liter, vagy
Systhane Duplo	13 ml/100 liter, vagy
Dynali	60 ml/100 liter, vagy
Raly Q SC	100 ml/100 liter, vagy
Talendo Extra	25 ml/100 liter.
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.
Bogyófertőzésnél: Falkon 460 EC	30 ml/100 liter,
+ Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

B./ Peronoszpóra ellen- hatásmód szerinti rotálás mellett-

I./ Javaslat Pergado Cu	400 g/100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
II./ Javaslat Curzate Super DF	200 g/ 100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
III./ Javaslat Tanos 50 DF	40 g/ 100 liter; (helyi felszívódó + kontakt), vagy
IV./ Javaslat Valbon	200 g/100 liter (helyi felszívódó).
Pergado Cu helyettesítő készítmény - Acrobat MZ , Valis M.	
Curzate Super DF helyettesítő készítmény –Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben R, Curzate Super DF, Kupfer Fusilan WG.	
Tanos 50 DF helyettesítő készítmény – Mildicut, Enervin.	
Valbon helyettesítő készítmény - Melody Compact.	

C./ Szükepenész, lisztharmat ellen-

Folicur solo	40 ml/100 liter, vagy
Tebusha 25 EW	40 ml/100 liter, vagy
Flint Max	20 g/100 liter, vagy
Collis SC,	40 ml/100 liter, vagy
Cantus	50 g/100 liter.
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

D./ Peronoszpóra – lisztharmat - szürkerothadás elleni kombinációk kialakításához:

Cabrio Top	200 g/100 liter, vagy
Shavit F	200 g/100 liter
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy,
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

E./ Amerikai szőlőkabóca ellen-

Bulldock 25 EC	50 ml/100 liter, vagy
Fendona 10 EC	10 ml/100 liter, vagy
King 10 F	10 ml/100 liter, vagy
Laser	40 ml/100 liter, vagy
Actara SC	30 ml/100 liter.

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)